| | 十四七 | , | | | 1 | 王 並口 2000 /2 /4 |
|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | 大腸が | ับ | | |] | 更新日:2023/3/1 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | オキサリプラチン レボホリナート | 点滴 | 85mg/m ² | d1 | |
| 2 | mFOLFOX6 | フルオロウラシル | 点滴 点滴 | 200mg/m ² 400mg/m ² | d1 d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m ² | d1 | |
| 3 | FOLFIRI | レボホリナート フルオロウラシル | <u>点滴</u> 点滴 | 200mg/m ² 400mg/m ² | d1 d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル | ******* | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |
| NI. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| No. | レンテン石 | アバスチン | 点滴 | <u>投予里</u> 5mg/kg | 技 力 d1 | 1コース期間(日) |
| | | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/ m ² | d1 | |
| 32 | mFOLFOX6+アバスチン5 | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m² | d1 d1(46時間かけて) | |
| <u> </u> | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/ m ² | 01 (40時间が1) () | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アバスチン イリノテカン | <u>点滴</u> 点滴 | 5mg/kg 150mg/ m ² | d1 d1 | |
| 33 | FOLFIRI+アバスチン5 | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m² | d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 51 | 5FU肝動注 | フルオロウラシル | 肝動注 | 750mg | d1 | 14 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 140. | <u> </u> | アバスチン | 点滴 | 5mg/kg | d1 | 11 八州町(口) |
| 58 | アバスチン5+sLV5FU2 | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m² | d1 | 14 |
| 30 |) / IX / 50 · SEV 01 02 | フルオロウラシル | | 400mg/m² | d1 | 17 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m [*] | d1(46時間かけて) | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量。 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 59 | アービタックス単独(初回) | アービタックス | 点滴 | 400mg/ m i | d1 | 7 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 60 | アービタックス単独(2回目以降) | アービタックス | 点滴 | 250mg/ m ² | d1 | 7 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| 61 | アービタックス+CPT-11(初回) | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m ² | d1 | 14 |
| | | アービタックス | 点滴 | 250mg/ m i | d8 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 62 | アービタックス+CPT-11(2回目以降) | アービタックス | 点滴 | 250mg/m ² | d1,8 | 14 |
| | | イリノテカン | 点滴 | 150mg/ m i | d1 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 65 | レボホリナート+5FU | レボホリナート フルオロウラシル | 点滴 点滴 | 250mg/m ² 600mg/m ² | d1,8,15,22,29,36 d1,8,15,22,29,36 | 56 |
| | | | | | | lleng (—) |
| No. | <u>レジメン名</u> イリノテカン単独150(2週) | 投与薬剤 イリノテカン | 投与経路 点滴 | 投与量 150mg/m ² | <u>投与日</u> d1 | 1コース期間(日) 14 |
| 00 | 1777777年在130(2週/ | 197732 | 示心 | 130Hig/ Hi | l di | 14 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス アービタックス | 点滴 点滴 | 400mg/m² 250mg/m² | d1 d8 | |
| | 7 L'A. A. FOLEST / TEL | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m² | do d1 | 4.4 |
| 92 | アービタックス+FOLFIRI(初回) | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル フルオロウラシル | | 400mg/m ² 2400mg/m ² | d1 d1(46時間かけて) | |
| | | | | | | <u> </u> |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 250mg/m ² | d1,8 | |
| 93 | アービタックス+FOLFIRI(2回目以降) | イリノテカン レボホリナート | <u>点滴</u> 点滴 | 150mg/m ² 200mg/m ² | d1 d1 | 14 |
| - | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |
| | | | 10. In AR 08 | ±π. ⊢ 🖽 | 10 | · #000 / D \ |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| No. | レジメン名 XELOX | 投与薬剤 オキサリプラチン カペシタビン | 投与経路 点滴 経口 | 授 与 重 130mg/m ² 2000mg/m ² /日 | 授与日 d1 d1夕-d15朝 | 1コース期間(日) 21 |

投与薬剤投与経路投与量アバスチン点滴7.5mg/kgオキサリプラチン点滴130mg/㎡カペシタビン経口2000mg/㎡/日

No.

101

レジメン名

XELOX+アバスチン7.5

投与日 d1 d1 d1夕-d15朝 1コース期間(日)

21

| 102 | No. | レジメン名 | 投与薬剤 アバスチン | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|--|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------|
| 15 | 102 | アバスチン7.5+カペシタビン | | <u>点滴</u> 経口 | 7.5mg/kg 2000mg/㎡/日 | d1 d1夕−d15朝 | 21 |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| TRIS-BEV (OPT-11/S1+アバスチン) | 116 | IRIS (CPT-11/S1) | | | | | 28 |
| 117 | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| No. | 117 | IRIS+BEV [CPT-11/S1+アバスチン] | イリノテカン | 点滴 | 100mg/ m i | d1,15 | 28 |
| 131 | | | • | | | | Wass (=) |
| No. | | | | | | | |
| 132 | | | | | | • | |
| 1922 ベクティビックス+FOLFIRI(初回) | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| Purt ロウジンル 点流 2400mg/m | | | | | | | |
| Pix Pi | 132 | ベクティビックス+FOLFIRI(初回) | | | | | 14 |
| No. | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | |
| 133 | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| 133 | | | | | | | |
| Pob | 133 | ベクティビックス+FOLFIRI(2回目以降) | | 点滴 | | | 14 |
| No. レジメン名 投与業剤 投与装飾 投与量 投与量 12一ス期間(日) イクティビックス+mFOLFOX6(初回) オキサリプラデン。点滴 8mg/kg d1 14 14 14 15 15 15 15 1 | | | フルオロウラシル | <u>点滴</u> 占油 | | | |
| ペクティビックス - 点海 Smg/kg d1 14 14 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 | | | | 示心 | 2400111g/111 | (1(40時間が1)で) | |
| A | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| 134 | | | | | | | |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与目 1コース期間(日) 14 14 15 15 15 15 15 15 | 134 | ベクティビックス+mFOLFOX6(初回) | レボホリナート | | | | 14 |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) イクティビックス+mFOLFOX6(2回目以降) レボルリナート 点滴 200mg/m di | | | | | | | |
| Aクティビックス +mFOLFOX6(2回目以降) | | | ノルオロワランル | 点凋 | 2400mg/ m | d1(46時间かげて) | |
| 35 | No. | レジメン名 | | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 135 | | | | | | | |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与目 1コース期間(日) 137 ベクティビックス+sLV5FU2(初回) 大グライビックス 点滴 6mg/kg d1 14 14 15 15 15 15 15 1 | 135 | ベクティビックス+mFOLFOX6(2回日以降) | | | | | 14 |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与目 1コース期間(日) 136 ベクティビックス+sLV5FU2(初回) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 No. レジメン名 投与薬剤 200mg/m d1(46時間かけて) 14 137 ベクティビックス+sLV5FU2(2回目以降) レジメン名 投与薬剤 投与薬剤 投り は1 14 137 ベクティビックス+sLV5FU2(2回目以降) レジメン名 投与薬剤 投り d1 14 138 ベクティビックス+イリノテカン150(初回) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 138 ベクティビックス+イリノテカン150(初回) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 139 ベクティビックス+イリノテカン150(2回目以降) ベクティビックス 点滴 16mg/kg d1 14 139 ベクティビックス+イリノテカン150(2回目以降) グライビックス 点滴 150mg/m d1 14 No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与目 12ース期間(日) 147 血管痛対策とLOX オキサリブラテン 点滴 130mg/m d1 14 No. レジメン名 投与薬剤 投与 | 100 | | | | | d1 | |
| 136 | | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/ m ² | d1(46時間かけて) | |
| 136 | No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 100 | | | | | | | |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 1コース期間(日) 14 14 15 15 15 15 15 15 | 136 | ベクティビックス+sLV5FU2(初回) | | | | | 14 |
| 137 ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 14 14 14 14 14 14 | | | | | | | |
| 137 ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 14 14 14 14 14 14 | NI. | ロジル の | 机上带到 | +ル ► ⟨又 □々 | 机上旦 | ₩₽□ | 1 7 世間(口) |
| 137 | NO. | レジネノ名 | 12 2 2 2 2 1 2 1 3 | | | | コー人期间(ロ) |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与 1コース期間(日) 138 ベクティビックス+イリノテカン 150(初回) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 14 14 150mg/m d1 14 14 150mg/m d1 14 14 150mg/m d1 14 14 150mg/m d1 15 | 137 | ベクティビックス+sl V5FH2(2回日以降) | レボホリナート | 点滴 | 200mg/ m i | d1 | 14 |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 138 ベクティビックス+イリノテカン150(初回) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 No. レジメン名 投与薬剤 投与薬剤 投与量 投与日 1コース期間(日) 139 ベクティビックス+イリノテカン150(2回目以降) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 No. レジメン名 投与薬剤 投与薬剤 投与量 投与日 1コース期間(日) 147 血管痛対策XELOX オキサリプラチン 点滴 130mg/m d1 21 No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 148 血管痛対策XELOX+アパスチン7.5 アパスチン 点滴 7.5mg/kg d1 21 No. レジメン名 投与薬剤 投与薬剤 投与経路 投与 1コース期間(日) No. レジメン名 投与薬剤 投与薬剤 投与経路 投与 1コース期間(日) No. レジメン名 投与薬剤 投与薬剤 投与 投与 1コース期間(日) No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与 <td>107</td> <td>ラブリロググス(354の)の2(2回日次四)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.7</td> | 107 | ラブリロググス(354の)の2(2回日次四) | | | | | 1.7 |
| 138 ベクティビックス+イリノテカン150(初回) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 d1 14 14 150mg/m d1 14 14 150mg/m d1 14 150mg/m d1 14 150mg/m d1 14 150mg/m d1 14 17 17 17 17 18 17 18 18 | | | J J J J J J J J J J J J J J J J J J J | 从 间 | 2400mg/111 | (40時間がりて) | |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 139 ベクティビックス+イリノテカン150(2回目以降) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 14 14 14 150mg/m d1 14 14 150mg/m d1 14 14 150mg/m d1 150mg/m d1 150mg/m d1 150mg/m d1 17 17 15 15 15 15 15 1 | No. | レジメン名 | 投与薬剤 | | | | 1コース期間(日) |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 139 ベクティビックス+イリノテカン150(2回目以降) ベクティビックス 点滴 6mg/kg d1 (イリ/テカン 点滴 150mg/m d1 (1 14 No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 (1コース期間(日) (147) 独管痛対策XELOX オキサリブラチン 点滴 130mg/m d1 (19 -d15朝) 21 No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 (1コース期間(日) (148) サイナサリブラチン 点滴 (190mg/m) (19 d1 (19 -d15朝) 21 No. レジメン名 投与薬剤 (19 を経路 (19 を経路 (19 -d15射) (19 -d15射) 21 No. レジメン名 投与薬剤 (19 を経路 (19 -d15射) (19 -d15射) 21 No. レジメン名 (19 -d15射) (19 -d15射) 21 No. レジメン名 (19 -d15射) (19 -d15射) (19 -d15射) 21 -d15射 No. レジメン名 (19 -d15射) (19 -d15射) (19 -d15射) (19 -d15射) 21 -d15射 No. レジメン名 (19 -d15射) (19 | 138 | ベクティビックス+イリノテカン150(初回) | ベクティビックス | | | | 14 |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与目 1コース期間(日) オキサリプラチン 点滴 130mg/m d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d | | | 197732 | 示心 | 130Hig/ III | u i | |
| No. | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 147 血管痛対策XELOX オキサリプラチン カペシタビン 点滴 130mg/m² 経口 d1 21 21 No. レジメン名 投与薬剤 アバスチン カペシタビン 投与経路 点滴 投与量 イキサリプラチン 点滴 カペシタビン 投与 経口 経口 130mg/m² 位別のmg/m² 位別 イリノテカン 点滴 21 No. レジメン名 投与薬剤 | 139 | ベクティビックス+イリノテカン150(2回目以降) | | | 6mg/kg 150mg/m² | | 14 |
| 147 血管痛対策XELOX | | | | | | <u> </u> | |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 1コース期間(日) 148 血管痛対策XELOX+アバスチン7.5 大キサリプラチン 点滴 130mg/m d1 21 148 血管痛対策XELOX+アバスチン7.5 大キサリプラチン 点滴 130mg/m d1 21 163 163 164 FOLFIRI+アバスチン10 上ボホリナート 点滴 200mg/m d1 14 164 164 FOLFIRI+アバスチン10 上ボホリナート 点滴 10mg/kg d1 17ルオロウラシル 点滴 10mg/kg d1 14 164 165 166 167 167 168 169 16 | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与目 1コース期間(日) 148 血管痛対策XELOX+アパスチン7.5 オキサリプラチン 点滴 130mg/㎡ d1 21 21 No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 163 sLV5FU2 セボホリナート 点滴 200mg/㎡ d1 2400mg/㎡ d1 7ルオロウラシル 点滴 2400mg/㎡ d1(46時間かけて) 14 No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 7ルオロウラシル 点滴 150mg/㎡ d1 41(46時間かけて) 14 No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) 7パスチン 点滴 150mg/㎡ d1 10mg/kg d1 41リノテカン 点滴 150mg/㎡ d1 10mg/kg d1 41リノデカン 点滴 150mg/㎡ d1 10mg/kg d1 41リノテカン 点滴 150mg/㎡ d1 10mg/m² d1 14 14 164 FOLFIRI+アパスチン10 レボホリナート 点滴 200mg/㎡ d1 14 14 フルオロウラシル 点滴 150mg/㎡ d1 10mg/m² d1 11 14 | 147 | 血管痛対策XELOX | | | | | 21 |
| Total | | | | | | | |
| 148 血管痛対策XELOX+アバスチン7.5 オキサリプラチン 点滴 130mg/m ² d1 21 カペシタビン 経口 2000mg/m ² /日 d1ターd15朝 21 | No. | レジメン名 | | | | | 1コース期間(日) |
| No. レジメン名 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) しボホリナート 点滴 200mg/m ² d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d | 148 | 血管痛対策XELOX+アバスチン7.5 | | | | | 21 |
| Lボホリナート 点滴 200mg/m d1 | | | | | | | - |
| Lボホリナート 点滴 200mg/m d1 | No | しぶかを | 投与蒸 刻 | 地片 级败 | 投与 导 | | 1つ―7 期間(ロ) |
| SLV5FU2 フルオロウラシル 点滴 400mg/m d1 14 14 フルオロウラシル 点滴 2400mg/m d1(46時間かけて) No. | IVO. | V///21 | | | | | 一一 一个物间(ロ) |
| No. レジメン名 投与薬剤 投与経路 投与量 投与日 1コース期間(日) アパスチン 点滴 10mg/kg d1 イリノテカン 点滴 150mg/m² d1 レボホリナート 点滴 200mg/m² d1 フルオロウラシル 点滴 400mg/m² d1 | 163 | sLV5FU2 | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | 14 |
| Tバスチン 点滴 10mg/kg d1 イリノテカン 点滴 150mg/m³ d1 164 FOLFIRI+アバスチン10 レボホリナート 点滴 200mg/m³ d1 14 フルオロウラシル 点滴 400mg/m³ d1 400mg/m³ d1 14 | | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m | d1(46時間かけて) | |
| Tバスチン 点滴 10mg/kg d1 イリノテカン 点滴 150mg/m³ d1 164 FOLFIRI+アバスチン10 レボホリナート 点滴 200mg/m³ d1 14 フルオロウラシル 点滴 400mg/m³ d1 400mg/m³ d1 14 | No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 164 FOLFIRI+アバスチン10 レボホリナート 点滴 200mg/m d1 14 フルオロウラシル 点滴 400mg/m d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 | | | アバスチン | 点滴 | 10mg/kg | d1 | |
| フルオロウラシル 点滴 400mg/㎡ d1 | 164 | FOI FIRI+アバスチン10 | | | | | 14 |
| フルオロウラシル 点滴 2400mg/m d1(46時間かけて) | | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| | | | | | | | |

| | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|--------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 198 | XELIRI | イリノテカン | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | 21 |
| | | カペシタビン | 経口 | 1600mg/m ² /日 | d1タ-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アバスチン | 点滴 | 7.5mg/kg | d1 | |
| 199 | XELIRI+アバスチン | イリノテカン | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | 21 |
| | | カペシタビン | 経口 | 1600mg/m ² /日 | d1タ-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 210 | SOX[S1/オキサリプラチン] | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/ m i | d1 | 21 |
| 210 | 30/(31/7) 4 9 99 97 97 | S1 | 経口 | 80mg/ ㎡ /日 | d1タ-d15朝 | 21 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 140. | レンバン・ロ | アバスチン | 点滴 | 7.5mg/kg | d1 | |
| 211 | SOX+アバスチン〔S1/オキサリプラチン/アバスチン〕 | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 経口 | 80mg/ ㎡ /日 | d1タ-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 212 | アバスチン/S1 | アバスチン | 点滴 | 7.5mg/kg | d1 | 21 |
| 212 | 7/12/31 | S1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | d1タ-d15朝 | 21 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| INO. | レンテン石 | アービタックス | <u>技子程</u> 点滴 | 技分里 400mg/㎡ | 技子口 d1 | コー人期间(ロ) |
| | | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/ m ² | d1 | |
| 232 | アービタックス+mFOLFOX6(初回) | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | 14 |
| 202 | 、こググバ·iiii OEi OXO(別回) | フルオロウラシル | | 400mg/m ² | d1 | 17 |
| | | フルオロウラシル アービタックス | 点滴 点滴 | 2400mg/m² 250mg/m² | d1(46時間かけて) d8 | |
| | |) [] | 邢旭 | ZJOIIIg/ III | uo | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 250mg/m ² | d1,8 | |
| 233 | アービタックス+mFOLFOX6(2回目以降) | オキサリプラチン レボホリナート | 点滴 | 85mg/m ² 200mg/m ² | d1 d1 | 14 |
| 233 |)—Lタグクス・IIIFOLFOX0(2回日以降) | フルオロウラシル | 点滴 点滴 | 400mg/m² | d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m² | d1(46時間かけて) | |
| | | 151 454 | 10 / /=== | | | W= 55 (-) |
| No. | レジメン名 | サラ薬剤 オキサリプラチン | 投与経路 点滴 | <u>投与量</u> 130mg/㎡ | 投与日 d1 | 1コース期間(日) |
| 247 | 血管痛対策SOX | S1 | 経口 | 80mg/m²/日 | d1ターd15朝 | 21 |
| | | | | | | |
| No. | レジメン名 | <u>投与薬剤</u> アバスチン | 投与経路 | | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 248 | 血管痛対策SOX+アバスチン | オキサリプラチン | 点滴 点滴 | 7.5mg/kg 130mg/m² | <u>d1</u> d1 | 21 |
| | | S1 | 経口 | 80mg/m²/日 | d1タ-d15朝 | |
| | | | | 10 5 8 | 18 5 = | #222 (=) |
| | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| No. | | | 占油 | 0 m ~ /l/~ | | |
| INO. | 7777 11 | サイラムザ | 点滴 点滴 | 8mg/kg 150mg/m² | d1 | |
| 308 | FOLFIRI+サイラムザ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート | 点滴 点滴 | 8mg/kg 150mg/m² 200mg/m² | | 14 |
| | | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル | 点滴 点滴 点滴 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² | d1 d1 d1 d1 | |
| | | サイラムザ イリノテカン レボホリナート | 点滴 点滴 点滴 | 150mg/ m ² 200mg/ m ² | d1 d1 d1 | |
| 308 | FOLFIRI+サイラムザ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 点滴 点滴 点滴 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² | d1 d1 d1 d1 | 14 |
| | | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル | 点滴 点滴 点滴 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 | |
| 308 | FOLFIRI+サイラムザ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル アバスチン ユーエフティ | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 内服 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 5mg/kg 300mg/m ² /日 | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1タ-d22昼 | 14 |
| 308 No. | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 25mg/kg | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 | 14 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル アバスチン ユーエフティ ホリナート | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点。 投与点形服内内 | 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡ 2400mg/㎡ 按与量 5mg/kg 300mg/㎡/日 75mg/body/日 | d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 | 14 1コース期間(日) 28 |
| 308 No. | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル アバスチン ユーエフティ | 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 内服 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 投与量 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1タ-d22昼 | 14 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 大クを変別 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点, 经 点服服 路 内内 经高高 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 400mg/m ³ 4400mg/m ³ 2400mg/m ³ 接与量 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ³ | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 大タ与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点, 经有限服 经商商服 经商商商 医人名 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 按与量 5mg/kg 300mg/m ² /月 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1タ-d22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd21個 d1 | 14 1コース期間(日) 28 |
| 308 No. 315 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 4400mg/m ² 2400mg/m ² 按与量 5mg/kg 300mg/m ² /日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd21 位1 d1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 No. | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 400mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ³ 200mg/m ³ 400mg/m ³ | d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd210 d1 d1 d1 d1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 400mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 按与量 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ³ 200mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ | d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 せら日 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 No. | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 大タ与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 次クティビックス | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 400mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 按与量 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m ³ 200mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 せら日 d1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 No. 318 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート サルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル オクティビックス イリノテカン | 点点点点 经点点内内 投点点点点点 经高限服 经高滴滴滴 经商服服 经滴滴滴滴滴 经滴滴滴滴滴滴 路 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 按与量 5mg/kg 300mg/m ² /日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 位1ターd22昼 位1 位1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 No. | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 大タ与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 次クティビックス | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 400mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 按与量 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m ³ 200mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 位1ターd22日 位1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 No. 318 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アパスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート | 点点点点 投 人名 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 按与量 5mg/kg 300mg/m ² /月 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 250mg/m ² 200mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22日 d1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル スイリノテカン レボホリナート オキサリプラチン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル | 点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 200mg/m ⁴ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ⁴ 按与量 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m ³ 200mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 250mg/m ³ 250mg/m ³ 2400mg/m ³ 250mg/m ³ 200mg/m ³ | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22屋 d1ターd22屋 d1ターd22屋 投与日 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1 d1 d1 d1 | 14 13一ス期間(日) 28 13一ス期間(日) 14 13一ス期間(日) |
| 308 No. 315 No. 318 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル | 点点点点 经 点点点点 经 点点点点 经 点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 200mg/m ⁴ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ⁴ 按与量 5mg/kg 300mg/m ³ /日 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m ³ 200mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 250mg/m ³ | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22屋 d1ターd22屋 d1ターd22屋 投与日 d1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1 d1 d1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル スイリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル マケティビックス イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル | 点点点点 投 | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 按与量 5mg/kg 300mg/m ² /月 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 250mg/m ² 2400mg/m ² 250mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル マイリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 点点点点 经 | 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 400mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m³/ 万5mg/kg 300mg/m³/日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² | は1 は1 は1 は1 は1 は1(46時間かけて) 投与日 は1,15 は1ターは22屋 は1ターは22屋 投与日 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与ネビックス イリノテカン レボホリナート オキサリブラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリブラチン フルオロウラシル | 上 | 150mg/m ² 200mg/m ³ 200mg/m ³ 400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 按与量 5mg/kg 300mg/m/日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ³ 200mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 2400mg/m ³ 250mg/m ³ | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22日 位1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル マイリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 点点点点 经 | 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 400mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m³/ 万5mg/kg 300mg/m³/日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² 250mg/m² | は1 は1 は1 は1 は1 は1(46時間かけて) 投与日 は1,15 は1ターは22屋 は1ターは22屋 投与日 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与薬剤 アパスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン フルオリナート オキサリプラチン レボホリナート オキサリプラシル フルオロウラシル と乗剤 イリノテカン レボホリナート オキサリプラシル フルオロウラシル | 点点点点 投 | 150mg/m ² 200mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 5mg/kg 300mg/m ² /H 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m ² 2400mg/m ² 2400mg/m ² 25mg/kg 150mg/m ² 2400mg/m ² 25mg/kg 150mg/m ² 25mg/kg 150mg/m ² 25mg/m ² | d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22日 位1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アパスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(2回目以降) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン フルオロウラシル オキサリプラチン フルオロウラシル オキサリプラチン フルオロウラシル アバスチン フルオロウラシル アイリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル アイリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル | 左点点点点 经点内内 经点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点 | 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 400mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 5mg/kg 300mg/m³/日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 2400mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 2400mg/m² 25mg/m² 2400mg/m² | d1 d1 d1 d1 d1 d1(46時間かけて) 投与日 d1,15 d1ターd22昼 d1ターd22昼 d1ターd22昼 位1ターd22昼 位1 位1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |
| No. 318 No. 323 No. 324 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(2回目以降) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与ネピックス イリノテカン レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル フルオロウラシル カー・オキサリプラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン レボホリナート オキサリプララシル イリノテカン レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル | 上京 | 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 400mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m³ 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 2400mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² | は1 は1 は1 は1 は1 は1(46時間かけて) 投与日 は1,15 は1ターは22屋 は1ターは22屋 投与日 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |
| 308 No. 315 No. 318 No. 323 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アパスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(2回目以降) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与ネビックス イリノテカン レボホリナート オキサリブラチン フルオロウラシル フルオロウラシル をクティビックス イリノテカン レボホリナート オキサリブラチン フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリブラチン フルオロウラシル | 上 | 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 400mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 5mg/kg 300mg/m/日 75mg/body/日 投与量 4mg/kg 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 200mg/m² | は1 は1 は1 は1 は1 は1(46時間かけて) 投与日 は1,15 は1ターは22屋 は1ターは22屋 は1ターは22屋 投与日 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |
| No. 318 No. 323 No. 324 | FOLFIRI+サイラムザ レジメン名 UFTホリナート+アバスチン5 レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回) レジメン名 ベクティビックス+FOLFOXIRI(2回目以降) | サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与薬剤 アバスチン ユーエフティ ホリナート 投与薬剤 ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル 投与ネピックス イリノテカン レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル フルオロウラシル カー・オキサリプラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン レボホリナート オキサリプララシル イリノテカン レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル レボホリナート オキサリプラシル | 上京 | 150mg/m² 200mg/m² 200mg/m² 400mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m³ 75mg/body/日 按与量 4mg/kg 150mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 2400mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 25mg/kg 150mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 2400mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² 25mg/m² | は1 は1 は1 は1 は1 は1(46時間かけて) 投与日 は1,15 は1ターは22屋 は1ターは22屋 投与日 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 は1 | 14 1コース期間(日) 28 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 1コース期間(日) 14 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|------|---|----------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------|
| 326 | アバスチン5+ロンサーフ | アバスチン | 点滴 | 5mg/kg | d1,15 d1タ-d6朝 | 28 |
| 020 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ロンサーフ | 内服 | 70mg/m²/日 | d8夕-d13朝 | 20 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| INO. | D 27/2/0 | イリノテカン | 点滴 | 150mg/ m i | d1 | 13 八州町(口) |
| 328 | FOLFOXIRI | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m² | d1 | 14 |
| | | オキサリプラチン フルオロウラシル | 点滴 点滴 | 85mg/ m ² 2400mg/ m ² | d1 d1(46時間かけて) | |
| N | 1 × 1× 4 | 机上类如 | +n. ⊢ v⊽ nb | 机厂目 | +1.1-1 | 1 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 アービタックス | 投与経路 点滴 | 投与量 400mg/m ² | 投与日 d1 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 250mg/m ² | d8 | |
| 329 | アービタックス+FOLFOXIRI(初回) | イリノテカン レボホリナート | 点滴 点滴 | 150mg/m ² 200mg/m ² | d1 d1 | 14 |
| | | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/ m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 400mg/m² | d1,8 | |
| 330 | アービタックス+FOLFOXIRI(2回目以降) | イリノテカン レボホリナート | 点滴 点滴 | 150mg/m ² 200mg/m ² | d1 d1 | 14 |
| 000 | , Eppy Holi onitive Election | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/ m ² | d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/ m ² | d1(46時間かけて) | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 332 | アバスチン10/S1 | アバスチン | 点滴 | 10mg/kg | d1,15 | 28 |
| | | S1 | 内服 | 80mg/ ㎡ /日 | d1夕−d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 335 | アービタックス/S1(初回) | アービタックス アービタックス | <u>点滴</u> 点滴 | 400mg/m² 250mg/m² | d1 d8,15,22,29,36 | 42 |
| 300 | プログランス/31(物画/ | S1 | 内服 | 80mg/m²/日 | d0,13,22,23,30 d1夕-d29朝 | 72 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 336 | • | アービタックス | 点滴 | <u>投予里</u> 250mg/m ² | d1,8,15,22,29,36 | |
| 336 | アービタックス/S1(2回目以降) | S1 | 内服 | 80mg/m ² /日 | d1タ-d29朝 | 42 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| 343 | アービタックス+SOX(初回) | アービタックス オキサリプラチン | 点滴 点滴 | 250mg/m ² 130mg/m ² | d8,15 d1 | 21 |
| | | S1 | 内服 | 80mg/m²/日 | d1タ-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| NO. | レンパンセ | アービタックス | 点滴 | 250mg/m ² | <u>投予日</u> d1,8,15 | 「コース粉间(ロ) |
| 344 | アービタックス+SOX(2回目以降) | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 内服 | 80mg/ m ² /日 | d1タ-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス アービタックス | 点滴 点滴 | 400mg/m ² 250mg/m ² | d1 d8,15 | |
| 345 | 血管痛対策アービタックス+SOX(初回) | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/ m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 内服 | 80mg/ ㎡ /日 | d1タ-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 346 | 血管痛対策アービタックス+SOX(2回目以降) | アービタックス オキサリプラチン | 点滴 | 250mg/m ² 130mg/m ² | d1,8,15 d1 | 21 |
| 340 | 皿 67用/3 水 / 「L ブノンヘ™3U∧(Z凹 日 以降) | オキザリノフテン S1 | 点滴 内服 | 130mg/m 80mg/m²/日 | d1夕-d15朝 | ۷۱ |
| N | 1.25.45.45 | | | - | | 17_7#88/7 |
| No. | レジメン名 | <u>投与薬剤</u> アバスチン | 投与経路 点滴 | <u>投与量</u> 7.5mg/kg | <u>投与日</u> d1 | 1コース期間(日) |
| 371 | SIRB [アバスチン+イリノテカン/S1] | イリノテカン | 点滴 | 150mg/ m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 内服 | 80mg/ ㎡ /日 | d1夕−d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 500mg/m ² | d1 | |
| 397 | biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(初回) | オキサリプラチン レボホリナート | <u>点滴</u> 点滴 | 85mg/ m 200mg/ m | d1 d1 | 14 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| | | <u> フルオロウラシル</u> | 点滴 | 2400mg/m [*] | d1(46時間かけて) | <u> </u> |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス オキサリプラチン | 点滴 点滴 | 500mg/m [*] 85mg/m [*] | d1 d1 | |
| | | レボホリナート | 点滴 点滴 | 200mg/m² | d1 | |
| 398 | biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(2回目以降) | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | 14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | アービタックス | 点滴 | 500mg/m ² | d1 | |
| | | イリノテカン | 点滴 | 150mg/ m ² | d1 | |
| 399 | biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(初回) | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m² | d1 | 14 |
| | | フルオロウラシルフルオロウラシル | | 400mg/m ² | d1 d1(46時間かけて) | |
| <u> </u> | | フル4ロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | 01 (40時 町かげ) () | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 500mg/m ² | d1 | |
| | | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m ² | d1 | |
| 400 | biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(2回目以降) | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m² | d1 | 14 |
| | | フルオロウラシルフルオロウラシル | | 400mg/m² 2400mg/m² | d1 d1(46時間かけて) | |
| | | フル4ロウラシル | | 2400mg/ 111 | 01 (40時 町かげ) () | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 400mg/m² | d1 | |
| 404 | アービタックス+IRIS(CPT-11/S1)(初回) | アービタックス | 点滴 | 250mg/m ² | d8,15 | 21 |
| 104 | , こグググベー Tuo (OF T TI) OF (内国) | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 内服 | 80mg/ m */日 | d1タ-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| INO. | <u>レンバン石</u> | アービタックス | 点滴 | 250mg/ m ² | d1,8,15 | コース物間(ロ) |
| 405 | アービタックス+IRIS(CPT-11/S1)(2回目以降) | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m² | d1 | 21 |
| | | S1 | 内服 | 80mg/m ² /日 | d1タ-d15朝 | |
| | | | I 15 / /=== | | 15. | W= 55 (=) |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 430 | アービタックス+ビラフトビ(初回) | アービタックス | 点滴 | 400mg/m [*] | d1 | 7 |
| <u> </u> | | ビラフトビ | 内服 | 300mg/日 | 連日 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | · | アービタックス | 点滴 | 250mg/m ² | d1 | |
| 431 | アービタックス+ビラフトビ(2回目以降) | ビラフトビ | 内服 | 300mg/日 | 連日 | 7 |
| | | | | | | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 432 | アービタックス+ビラフトビ+メクトビ(初回) | <u>アービタックス</u> ビラフトビ | 点滴 | 400mg/m² | d1 油口 | 7 |
| 432 | ゲーにダックステレ フントレースクトレ(初回) | メクトビ | 内服 内服 | 300mg/日 90mg/日 | 連日 連日 | · ' |
| | | アクトレ | אות ניין | эоніg/ Ц |) 建口 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| | | アービタックス | 点滴 | 250mg/ m ² | d1 | |
| 433 | アービタックス+ビラフトビ+メクトビ(2回目以降) | ビラフトビ | 内服 | 300mg/日 | 連日 | 7 |
| | | メクトビ | 内服 | 90mg/日 | 連日 | |
| N _a | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| No. | | パージェタ | 点滴 | <u>投予里</u> 840mg | 技学口 d1 | |
| 437 | パージェダ840+ハーセプチン(初回) | ハーセプチン | 点滴 | 8mg/kg | d1 | 21 |
| · | | | 711.71-7 | 5111g/ Ng | | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 438 | パージェダ420+ハーセプチン(2回目以降) | パージェタ | 点滴 | 420mg | d1 | 21 |
| .00 | | ハーセプチン | 点滴 | 6mg/kg | d1 | |
| | | | | | | |
| | | 1 00 / 2 / | | | 1 | |
| | MSI-highを有する | 大腸がん | | | | |
| | | | | | | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 298 | オプジーボ単剤 | オプジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |
| ., . | 1 10 12 12 | 10. F ** ** | ±0. 1= 4≈ 05 | ±n. ⊢ □ | ±n. ⊢ ¬ | 4— = #500 / E \ |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 299 | オプジーボ単剤(過敏症対策) | オプジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 316 | キイトルーダ単独 | キイトルーダ | 点滴 | 200mg/body | d1 | 21 |
| | 1112 | | | J | • | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 353 | オプジーボ+ヤーボイ | オプジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 21 |
| -550 | Week and Child | ヤーボイ | 点滴 | 1mg/kg | d1 | |
| Na | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| No. | レンメン名 キイトルーダ単独【6週間隔】 | <u> </u> | 点滴 | 技分里 400mg | <u>按与日</u> d1 | 1コー人期间(日) |
| 500 | 11177 ノギ海口週间間 | <u> </u> | 灬问 | TOUR | ı uı | 74 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 389 | オプジーボ単独【4週間隔】 | オプジーボ | 点滴 | 480mg | d1 | 28 |
| | | | | | | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 390 | オプジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】 | オプジーボ | 点滴 | 480mg | d1 | 28 |
| | | | | | | |