

◆消化器内視鏡検査◆ を受けられる患者さんへ

表に示すクスリは、消化器内視鏡検査を行う場合に中止（休薬）する場合があります。内視鏡検査の前には服用中のお薬を確認しますので、必ず担当医師に申しでてください。また、中止（休薬）をすることによる影響について処方医師に確認させていただきます。

なお、健康食品、サプリメントなどについても、どのような影響があるか不明ですので、必ず申し出てください。

分類	当院採用薬		(主な) 同成分商品名	休薬の目安	患者さんへの指示
抗凝固薬	ワーファリン錠	1mg	ワルファリンカウム、ワルファリンK	4日前 (3-5日前)	<input type="checkbox"/> 休薬せずに検査を行います。 <input type="checkbox"/> ____月____日(朝・夕)より休薬してください。 <input type="checkbox"/> ____月____日に入院しヘパリンを使用します。
	プラザキサカ [®] セル	75mg、110mg	ダビガトランエテキシネートメタン磺酸塩	当日朝 ※1	
	エリキュース錠	2.5mg、5mg	アピキサバン	当日朝 ※2	
	イグザレルト錠	10mg、15mg	リバーロキサバン		
	リクシアナ錠	15mg、60mg	エドキサバントシル酸塩		
アスピリン	バイアスピリン錠	100mg	アスピリン、ゼンアスピリン、アスファート配合、ニトギス配合、バファリン配合、バッサミン配合、ファモター配合、イスキア配合	3-5日前	<input type="checkbox"/> 休薬せずに検査を行います。 <input type="checkbox"/> ____月____日より休薬してください。
	アスピリンシオエ				
	—		タケルダ [®] 配合錠		
	—		キャブピリン配合錠		
チエノピリジン	—		コンプラビン配合錠、ロレアス配合錠	5-7日前	<input type="checkbox"/> 休薬せずに検査を行います。 <input type="checkbox"/> ____月____日朝より休薬してください。
	クロピドグレル錠	75mg	クロピドグレル硫酸塩、プラビックス		
	チクロピジン塩酸塩錠	100mg	チクロピジン塩酸塩、パナルジン、マイトジン		
	エフィエント錠	3.75mg	プラスグレル塩酸塩		
その他の抗血小板薬	—		ブリリント	5日前	<input type="checkbox"/> 休薬せずに検査を行います。 <input type="checkbox"/> ____月____日朝より休薬してください。
	シロスタゾールOD錠	100mg	シロスタゾール、プレタール、コートリズム、シロシナミン、プレトモール、ホルダゾール、シロスレット	1日前	
	エパデールS	900mg	イコサペント酸エチル、エパロース、エパラ、ソルミラン		
	ロトリガ粒状カ [®] セル				
	アンブラーグ錠	100mg	サルポグレラート塩酸塩		
	ベラプロストナトリウム錠	20 μg	ベラプロストナトリウム、プロサイリン、ドルナー		
	リマプロストアルファデクス錠	5 μg	リマプロストアルファデクス、オパルモン、プロレナール		
	ロコルナール錠	100mg	トラピジル		
	ジラゼブ塩酸塩錠	100mg	ジラゼブ塩酸塩、コメリアン		
ジピリダモール錠	25mg	ジピリダモール、ペルサンチン			

※1ヘパリンを使用する場合は2日前夕から休薬

※2ヘパリンを使用する場合は1日前から休薬