

## 尿路上皮がん

更新日: 2021/2/8

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
18	ピノルビン膀胱注	ピノルビン	膀胱注入	30mg	d1	7
48	ゲムシタピン単独(4週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	28
95	GC [ゲムシタピン+シスプラチン70](4週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	28
		シスプラチン	点滴	70mg/m <sup>2</sup>	d2	
96	M-VAC	メトレキセート	点滴	30mg/m <sup>2</sup>	d1,15,22	28
		エクザール	点滴	3mg/m <sup>2</sup>	d2,15,22	
		ドキシソルピシン	点滴	30mg/m <sup>2</sup>	d2	
		シスプラチン	点滴	70mg/m <sup>2</sup>	d2	
140	GC [ゲムシタピン+シスプラチン70](3週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8	21
		シスプラチン	点滴	70mg/m <sup>2</sup>	d2	
153	カルボプラチンAUC4.5+ゲムシタピン	カルボプラチン	点滴	AUC4.5	d1	21
		ゲムシタピン	点滴	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8	
228	シスプラチン+ドキシソルピシン動注	シスプラチン	動注	70mg/m <sup>2</sup>	d1	21
		ドキシソルピシン	動注	30mg/m <sup>2</sup>	d1	
297	ddMVAC	メトレキセート	点滴	30mg/m <sup>2</sup>	d1	14
		エクザール	点滴	3mg/m <sup>2</sup>	d2	
		ドキシソルピシン	点滴	30mg/m <sup>2</sup>	d2	
		シスプラチン	点滴	70mg/m <sup>2</sup>	d2	
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg/body	d1	21
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42

## 前立腺がん

78	ドセタキセル70(3週)	ドセタキセル	点滴	70mg/m <sup>2</sup>	d1	21
257	ジェブタナ単独	ジェブタナ	点滴	25mg/m <sup>2</sup>	d1	21

## 腎細胞がん

162	トーリセル	トーリセル	点滴	25mg	d1	7
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
353	オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	240mg	d1	21
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
381	キイトルーダ+アキシチニブ	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		インライタ	内服	1日2回1回5mg	連日	
387	バベンチオ+アキシチニブ	バベンチオ	点滴	10mg/kg	d1	14
		インライタ	内服	1日2回1回5mg	連日	
389	オブジーボ単独【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
390	オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28

## 副腎皮質がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
91	パクリタキセル70+カルボプラチンAUC5	パクリタキセル	点滴	70mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	28
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
123	EDP[エトポシド100+ドキシソルピシン20+シスプラチン40]/ミトタン	シスプラチン	点滴	40mg/m <sup>2</sup>	d1,9	28
		ドキシソルピシン	点滴	20mg/m <sup>2</sup>	d1,8	
		エトポシド	点滴	100mg/m <sup>2</sup>	d5,6,7	
		ミトタン	経口	4g/日	連日	

## 尿管がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
363	FP療法(尿管がん)[患者限定]	シスプラチン	点滴	80mg/m <sup>2</sup>	d1	21
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m <sup>2</sup>	d1-5	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
391	mFOLFOX6(尿管がん)[患者限定]	オキサリプラチン	点滴	85mg/m <sup>2</sup>	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1(46時間かけて)	