

胚細胞腫瘍

更新日: 2021/2/8

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------------|---------|------|----------------------|---------|-----------|
| 97 | VelP | イホマイド | 点滴 | 1.2g/m ² | d1-5 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 20mg/m ² | d1-5 | |
| | | エクザール | 点滴 | 0.11mg/kg | d1,2 | |
| 98 | EP [エトポシド100+シスプラチン] | エトポシド | 点滴 | 100mg/m ² | d1-5 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 20mg/m ² | d1-5 | |
| 99 | BEP | エトポシド | 点滴 | 100mg/m ² | d1-5 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 20mg/m ² | d1-5 | |
| | | プレオマイシン | 点滴 | 30mg | d2,9,16 | |
| 175 | イリノテカン+アクブラ | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m ² | d1 | 28 |
| | | アクブラ | 点滴 | 100mg/m ² | d1 | |
| 180 | カルボプラチン単独AUC7 | カルボプラチン | 点滴 | AUC7 | d1 | 28 |
| 213 | カルボプラチン+エトポシド(小児) | カルボプラチン | 点滴 | 300mg/m ² | d1 | 28 |
| | | エトポシド | 点滴 | 100mg/m ² | d1-3 | |
| 215 | カルボプラチン+エトポシド | カルボプラチン | 点滴 | 300mg/m ² | d1 | 28 |
| | | エトポシド | 点滴 | 100mg/m ² | d1-3 | |
| 331 | TIP | バクリタキセル | 点滴 | 175mg/m ² | d1 | 21 |
| | | イホマイド | 点滴 | 1.2g/m ² | d2-6 | |
| | | シスプラチン | 点滴 | 20mg/m ² | d2-6 | |
| 357 | VIP療法 | イホマイド | 点滴 | 1.2g/m ² | d1-5 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 20mg/m ² | d1-5 | |
| | | エトポシド | 点滴 | 75mg/m ² | d1-5 | |

悪性胸膜中皮腫

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|----|----------------------|----|----|
| 36 | アリムタ+シスプラチン75 | アリムタ | 点滴 | 500mg/m ² | d1 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 75mg/m ² | d1 | |
| 68 | アリムタ単独 | アリムタ | 点滴 | 500mg/m ² | d1 | 21 |
| 105 | アリムタ+カルボプラチンAUC6 | アリムタ | 点滴 | 500mg/m ² | d1 | 21 |
| | | カルボプラチン | 点滴 | AUC6 | d1 | |
| 298 | オブジーボ単剤 | オブジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |
| 299 | オブジーボ単剤(過敏症対策) | オブジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |
| 333 | シスプラチン+アリムタ(ショートハイドレーション) | アリムタ | 点滴 | 500mg/m ² | d1 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 75mg/m ² | d1 | |

リンパ腫

| | | | | | | |
|-----|----------------|--------|----|--------|----|----|
| 273 | エンドキサンのパルス1000 | エンドキサン | 点滴 | 1000mg | d1 | 28 |
|-----|----------------|--------|----|--------|----|----|

肛門がん

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|------------------|---------|------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 277 | MMC+カペシタビン+放射線併用 | マイトマイシン | 点滴 | 10mg/m ² | d1,29 | 56 |
| | | カペシタビン | 経口 | 1650mg/m ² /日 | d1-5,d8-12,15-19,22-26,29-33,36-38 | |

胸腺腫

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-------|----------|------|---------------------|------|-----------|
| 197 | CAMP | シスプラチン | 点滴 | 20mg/m ² | d1-4 | 28 |
| | | ソル・メルコート | 点滴 | 500mg 1日2回 | d1-4 | |
| | | ドキシソルピシン | 点滴 | 40mg/m ² | d1 | |
| | | ソル・メルコート | 点滴 | 250mg 1日2回 | d5,6 | |

悪性黒色腫

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-----------|--------|------|----------------------|-------|-----------|
| 220 | DAV-Feron | ダカルバジン | 点滴 | 120mg/m ² | d1-5 | 28 |
| | | ニドラン | 点滴 | 60mg/m ² | d1 | |
| | | オンコピン | 点滴 | 0.6mg/m ² | d1 | |
| | | フェロン | 局所注入 | 300万単位 | d1-10 | |

神経内分泌腫瘍(NET)

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------|--------|------|---------------------|---------|-----------|
| 90 | イリノテカン60+シスプラチン60 | イリノテカン | 点滴 | 60mg/m ² | d1,8,15 | 28 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 60mg/m ² | d1 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------------------------|--------|------|----------------------|------|-----------|
| 167 | CDDP+ETP[シスプラチン80+エトポシド] | エトポシド | 点滴 | 100mg/m ² | d1-3 | 28 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|---------------|------|------|-----------------------|-----|-----------|
| 260 | ザノサーweekly投与法 | ザノサー | 点滴 | 1000mg/m ² | d1 | 7 |

小腸がん

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------|----------|------|-----------------------|-------------|-----------|
| 2 | mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/m ² | d1 | 14 |
| | | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------|----------|------|--------------------------|----------|-----------|
| 101 | XELOX+アバスチン7.5 | アバスチン | 点滴 | 7.5mg/kg | d1 | 21 |
| | | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | |
| | | カペシタビン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1タ-d15朝 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|---------------------|----------|------|--------------------------|----------|-----------|
| 148 | 血管痛対策XELOX+アバスチン7.5 | アバスチン | 点滴 | 7.5mg/kg | d1 | 21 |
| | | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | |
| | | カペシタビン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1タ-d15朝 | |

高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------|--------|------|------------|-----|-----------|
| 316 | キイトルーダ単独 | キイトルーダ | 点滴 | 200mg/body | d1 | 21 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------|--------|------|-------|-----|-----------|
| 388 | キイトルーダ単独【6週間隔】 | キイトルーダ | 点滴 | 400mg | d1 | 42 |

アンスラサイクリン系血管外漏出時

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-------|------|------|-----------------------|------|-----------|
| 240 | サビーン | サビーン | 点滴 | 1000mg/m ² | d1,2 | 3 |
| | | サビーン | 点滴 | 500mg/m ² | d3 | |