	胚細胞腫	瘍				更新日:2024/11/1
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		イホマイド	点滴	1.2g/m ²	d1-5	
97	VeIP	シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d1-5	21
		エクザール	点滴	0.11mg/kg	d1,2	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
98	EP(シスプラチン+エトポシド)	エトポシド シスプラチン	点滴 点滴	<u>100mg/m²</u> 20mg/m²	d1-5 d1-5	21
<u> </u>		20000	示 问	ZUIIIg/ III	u1-3	
No.	レジメン名	投与薬剤 エトポシド	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
99	BEP	シスプラチン	点滴 点滴	100mg/m ² 20mg/m ²	d1-5 d1-5	21
	52.	ブレオマイシン	点滴	30mg	d2,9,16	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		イリノテカン	点滴	<u>投予里</u> 150mg/m [*]	成 サ ロ d1	
175	アクブラ+イリノテカン	アクプラ	点滴	100mg/m ²	d1	28
NI-	レジメン名	-	+几 上 収 収	投与量	投与日	1コース期間(日)
No. 180	カルボプラチン単独AUC7	投与薬剤 カルボプラチン	投与経路 点滴	及分里 AUC7	<u> 投与口</u> d1	28
					•	•
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
331	TIP	パクリタキセル イホマイド	<u>点滴</u> 点滴	<u>175mg/mੈ</u> 1.2g/mੈ	d1 d2-6	21
001	111	シスプラチン	点滴	20mg/m²	d2-6	- 21
					•	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
357	VIP療法	イホマイド	点滴	1.2g/m²	d1-5	21
337	VIF7京/A	シスプラチン エトポシド	点滴 点滴	20mg/ m² 75mg/ m²	d1-5 d1-5	
	悪性胸膜中	皮腫				
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		ペメトレキセド	点滴	<u>ステ星</u> 500mg/m ²	d1	
36	シスプラチン+ペメトレキセド	シスプラチン	点滴	75mg/ m i	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
68	ペメトレキセド単独	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	21
	1 28 15 77	40. F. ** **!	±□. ⊢ /▽ □b	10. F E	40.40	4— = #BB (B)
No.	レジメン名	投与薬剤 ペメトレキセド	投与経路 点滴	投与量 500mg/㎡	<u>投与日</u> d1	1コース期間(日)
105	カルボプラチンAUC6+ペメトレキセド	カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	21
NI I	1 2 3 15 . 2	机上数如		机上星	+n + n	1 7 7 知明/日)
No. 298	<u>レジメン名</u> オプジーボ単剤	投与薬剤 オプジーボ	投与経路 点滴	<u>投与量</u> 240mg	<u>投与日</u> d1	1コース期間(日) 14
No.	レジメン名 オプジーボ単剤(過敏症対策)	投与薬剤 オプジーボ	投与経路 点滴	<u>投与量</u> 240mg	<u>投与日</u> d1	1コース期間(日) 14
200	オック 小平州(追敬准対象/		•	-		•
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
333	シスプラチン+ペメトレキセド(ショートハイドレー ション)	ペメトレキセド シスプラチン	点滴 点滴	500mg/ m ² 75mg/ m ²	d1 d1	21
	717)		赤心	/Jillg/ III	<u> </u>	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
389	オプジーボ単独【4週間隔】	オプジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
390	オプジーボ単独(過敏症対策あり)【4週間隔】	オプジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
402	オプジーボ360+ヤーボイ	オプジーボ	点滴	360mg	d1,22	42
102	22.2 Mood (46.1	ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	76
	リンパ肌	重				
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
273	エンドキサンパルス1000	エンドキサン	点滴	1000mg	d1	28
					•	

A	Т	門	1	Ñ	٨	,

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		マイトマイシン	点滴	10mg/ m ²	d1,29	
277	マイトマイシン+カペシタビン+放射線併用	もぺと.わばい .	% ⊻□	1650mg/㎡/日	d1-5,d8-12,15-19,	56
		カペシタビン	経口	1650mg/mੈ/日	22-26,29-33,36-38	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
419	カルボプラチン+パクリタキセル(肛門管癌)[患者限定	パクリタキセル	点滴	175mg∕ m i̇́	d1	01
419	リルバノファン・バンソダイゼル(肛门管癌儿患有限と	カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	21

神経内分泌腫瘍(NET)

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
90	シスプラチン+イリノテカン	イリノテカン	点滴	60mg∕ m i̇́	d1,8,15	28
90	ンベンファンキャッショカン	シスプラチン	点滴	60mg/ m i̇́	d1	20
		•	•			
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
167	シスプラチン80+エトポシド	エトポシド	点滴	100mg/ m i	d1-3	28
107	プスプラブラ00 (五) (水) (シスプラチン	点滴	80mg/ m i	d1	20
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
260	ザノサーweekly投与法	ザノサー	点滴	1000mg/ m i̇́	d1	7
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
403	カルボプラチンAUC5+エトポシド80	カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	21
403	カルドン プランAUC3+エドバンド80	エトポシド	点滴	80mg/ m i	d1-3	21
	, . , , ,	エトボシド	点滴	80mg/ m î	d1−3	

小腸がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
	2 mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/ m i̇́	d1	
2		レボホリナート	点滴	200mg/ m i	d1	1.4
	IIIFOLFOXO	フルオロウラシル	点滴	400mg/ m i	d1	14
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/ m i	d1(46時間かけて)	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	
101	アバスチン7.5+CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg∕ m ੰ	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m²/⊟	d1夕-d15朗	ī l

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	
148	血管痛対策アバスチン7.5+CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/ m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/㎡/日	d1タ-d15朝	

高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42

高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する固形癌

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42

アンスラサイクリン系血管外漏出時

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
240	# Ľ_	サビーン	点滴	1000mg/ m ²	d1,2	2
240	J	サビーン	点滴	500mg/ m i	d3	3