

◆消化器内視鏡検査◆ を受けられる患者さんへ

表に示すクスリは、消化器内視鏡検査を行う場合に中止（休薬）する場合があります。
内視鏡検査の前には服用中のお薬を確認しますので、必ず担当医師に申しでてください。
また、中止（休薬）をすることによる影響について処方医師に確認させていただきます。
なお、健康食品、サプリメントなどについても、どのような影響があるか不明ですので、必ず申し出てください。

分類	当院採用薬	(主な) 同成分商品名	休薬の目安	患者さんへの指示
抗凝固薬	ワーファリン錠	ワルファリンカリウム、ワルファリンK	4日前 (3-5日前)	☐ 休薬せずに 検査を行います。
	プラザキサカ [®] セル	ダビガトラン	当日朝 ※1	
	エリキュース錠	アピキサバン		当日朝 ※2
	リバーロキサバン錠	リバーロキサバン、イグザレルト		
	リクシアナ錠	エドキサバン		
アスピリン	バイアスピリン錠	アスピリン、アスピリン腸溶錠、バファリン配合、バス サミン配合、ファモター配合、ニトギス配合	3-5日前	☐ 休薬せずに 検査を行います。 ☐ ____月____日より 休薬してください。
	アスピリン原末			
	—	タケルダ [®] 配合錠		
	—	キャブピリン配合錠		
チエノピリジン	—	コンプラビン配合錠、ロレアス配合錠	5-7日前	☐ 休薬せずに 検査を行います。 ☐ ____月____日朝より 休薬してください。
	クロピドグレル錠	クロピドグレル硫酸塩、プラビックス		
	—	チクロピジン塩酸塩、パナルジン		
	エフィエント錠	プラスグレル塩酸塩		
その他の抗血小板薬	—	チカグレロル、ブリリント	5日前	☐ 休薬せずに 検査を行います。 ☐ ____月____日朝より 休薬してください。
	シロスタゾールOD錠	シロスタゾール、プレタール	1日前	
	エパデールEMカプセル	イコサペント酸エチル、エパデールS		
	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル	オメガ-3脂肪酸エチル、ロトリガ粒状カプセル		
	サルボグレラート塩酸塩錠	サルボグレラート塩酸塩、アンブラーグ		
	ベラプロストナトリウム錠	ベラプロストナトリウム、プロサイリン		
	リマプロストアルファデクス錠	リマプロストアルファデクス、オパルモン		
	—	トラピジール、ロコルナール		
	コメリアンコーワ錠	ジラゼブ塩酸塩		
	ジピリダモール錠	ジピリダモール、ペルサンチン		

※1ヘパリンを使用する場合は2日前夕から休薬

※2ヘパリンを使用する場合は1日前から休薬